

## Mentoplastia – Cirurgia do Queixo

A cirurgia de queixo é realizada, geralmente, para corrigir imperfeições como hipermentonismo, ou queixo avançado, hipomentonismo, ou queixo para trás, e latero desvio, ou queixo com desvio para um dos lados da face.

A cirurgia é realizada com a inclusão de uma prótese em silicone, nos casos de queixo para trás ou de forma mais complexa, cortando-se o queixo e reposicionando-o no local correto, determinado na avaliação. Muitas vezes é necessária associação com a rinoplastia (cirurgia do nariz) para melhor resultado.

### Quando operar

Nos casos em que há uma assimetria do rosto decorrente do posicionamento do queixo recomenda-se a realização da mentoplastia para harmonização da face.

### Pré operatório

Serão necessários exames de rotina e risco cirúrgico para a realização da cirurgia. É importante informar ao cirurgião plástico a eventualidade de infecção em dentes, principalmente inferiores. Neste caso, é imprescindível o tratamento odontológico antes da cirurgia.

É importante lembrar que antes da realização de cirurgias, o paciente deve seguir algumas recomendações:

-não usar, por duas semanas antes, medicamentos à base de AAS, anticoagulantes, corticóides de uso prolongado ou medicamentos para emagrecer. Abstinência do fumo por 30 dias antes da operação; não usar cremes corporais a partir da véspera da cirurgia; não depilar ou raspar os pêlos pubianos em casa; jejum de acordo com a recomendação médica.

Comunique ao médico qualquer anormalidade, uso recente de medicamentos, alergias a remédios, ou a alimentos.

No dia marcado para a cirurgia tome banho completo e chegue ao local com uma hora de antecedência.

### Pós operatório

Após a cirurgia é feito um curativo local para imobilizar a prótese e proteger o queixo. É comum o inchaço e o surgimento de equimoses (manchas rochas) nos primeiros dias, que vão diminuindo com o tempo.

## Mentoplastia – Cirurgia do Queixo

Recomenda-se que os pacientes evitem conversas longas e alimentos duros nos primeiros sete dias após a cirurgia.

As atividades físicas podem ser retomadas após trinta dias e a exposição ao sol deve ser evitada no primeiro mês.

Os resultados definitivos serão percebidos somente após 12 meses e podem ser necessárias respeitando-se o tempo necessário para cada intervenção.

